



# WIRKSAM UND GUT VERTRÄGLICH ÜBER 3 JAHRE<sup>1,2</sup>

BUDESONID  
**Jorveza**<sup>®</sup>  
SCHMELZTABLETTEN

#### Referenzen

<sup>1</sup> Fachinformation Jorveza<sup>®</sup>. <sup>2</sup> Biedermann L, Schlag C, Straumann A et al. Efficacy and Safety of Budesonide Orodispersible Tablets for Eosinophilic Esophagitis up to 3 Years: an Open-Label Extension Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2024 Dec 16;S1542-3565(24)01088-7. Fachpersonen können die genannten Referenzen bei Dr. Falk Pharma AG anfordern.

**Jorveza<sup>®</sup> Schmelztabletten Z:** Budesonid. **I:** Behandlung der eosinophilen Ösophagitis (EoE) bei Erwachsenen. **D:** Induktionstherapie: Empfohlene Dosierung eine 1-mg-Schmelztablette morgens und eine abends pro Tag (2 mg). Erhaltungstherapie: Empfohlene Dosierung eine 0,5-mg-Schmelztablette morgens und eine abends pro Tag (1 mg) oder eine 1-mg-Schmelztablette morgens und eine abends pro Tag (2 mg). **KI:** Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. **WH/VM:** Erhöht die Anfälligkeit für Infektionen und deren Schweregrad (ösophageale Candida-Infektionen), gemeinsame Verabreichung von Lebendimpfstoffen und Glukokortikoiden ist zu vermeiden, systemische Glukokortikoidnebenwirkungen können auftreten. Windpocken, Herpes zoster und Masern können bei Patienten, die Glukokortikoide erhalten, einen schwerwiegenderen Verlauf nehmen, Sehstörungen. **UAW:** Orale Candidose und/oder Candidose des Oropharynx, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Geschmacksstörung, Trockene Augen, gastroösophageale Refluxkrankheit, Übelkeit, orale Parästhesie, Dyspepsie, Schmerzen im Oberbauch, Mundtrockenheit, Glossodynie, Erkrankung der Zunge, oraler Herpes, Müdigkeit, Cortisol im Blut erniedrigt. **SS:** Negativer Einfluss möglich, deshalb nur, falls notwendig. **IA:** CYP3A-Inhibitoren wie Ketoconazol, Ritonavir, Itraconazol, Clarithromycin, Cobicistat, Grapefruitsaft können die Budesonid-Konzentration ansteigen lassen, gleichzeitig eingenommene Östrogene oder orale Kontrazeptiva können den Plasmaspiegel der Glukokortikoide erhöhen. **Liste B:** ausführliche Informationen finden Sie in der Fachinformation unter [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch). Dr. Falk Pharma AG, Sägereistrasse 20, 8152 Opfikon. **Stand der Information:** Dezember 2022.