ZEPOSIA® 1x/jour | ozanimod

Bristol Myers Squibb™

ZEPOSIA® 1x täglich | ozanimod

Si vos patient·e·s RCH ne parviennent pas à atteindre leur objectif avec les thérapies conventionnelles[1]

Wenn Ihre CU-Patient:innen mit konventionellen Therapien nicht ans Ziel kommen[1]

BREAK THE CYCLE WITH ZEPOSIA®

JUSQU'À 10 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LA SEP ET LA RCH.#,2,4

BIS ZU 10 JAHRE ERFAHRUNG IN DER MS UND CU.#,2,4

Le modulateur sélectif du récepteur S1P vous offre :[1]

Prise orale 1 fois par jour*,1 + **Réponse rapide[3] & rémission durable**,2** + **Bonne sécurité à long terme#,2,4**

Pour plus d'informations, consultez notre nouveau portail **BMSplus.ch.** Veuillez scanner le code.

Der selektive S1P-Rezeptor-Modulator bietet Ihnen:[1]

1× tägliche orale Gabe*,1 + **Schnelles Ansprechen[3] & lang anhaltende Remission**,2** + **Gute Langzeit-Sicherheit#,2,4**

Mehr Informationen finden Sie auf unserem neuen Portal **BMSplus.ch.** Bitte Code scannen.

RCH : rectocolite hémorragique, **S1P :** sphingosine-1-phosphate, **SEP :** sclérose en plaques

* Une dose de 0,92 mg une fois tous les deux jours est recommandée chez les patient·e·s présentant une insuffisance hépatique chronique légère ou modérée (classe A ou B de Child-Pugh).[1]

** Basé sur l'étude TRUE NORTH OLE en cours pendant laquelle une analyse intermédiaire a évalué l'efficacité et la sécurité à long terme de l'ozanimod chez les patient·e·s ayant reçu jusqu'à 4 ans de traitement continu par l'ozanimod.[2]

\# Bonne tolérabilité de l'ozanimod après une exposition à long terme chez les patient·e·s avec une RCH modérée à sévère (n = 131, durée du traitement jusqu'à 194 semaines, soit environ 4 ans)[3] et chez les patient·e·s avec une SEP récurrente (DAYBREAK : n = 2494, durée moyenne du traitement 60,9 mois ; phase 3 et DAYBREAK : N = 881, durée moyenne du traitement 74,8 mois, durée maximale du traitement 117,2 mois).[4]

Références : 1. Information professionnelle de ZEPOSIA® (Ozanimod), www.swissmedicinfo.ch. **2.** D'Haens G et al. Efficacy and safety of 4 years of continuous ozanimod treatment: an interim analysis of the True North open-label extension study. ECCO février 2024, Stockholm; Poster P1009. **3.** Schreiber SW et al. Efficacy of ozanimod by patient response trajectory subgroups identified using group-based trajectory modeling: a post hoc analysis of the phase 3 True North study. ECCO février 2024, Stockholm; Présentation DOP78. **4.** Selmaj KW et al. Long-term safety and efficacy of ozanimod in relapsing multiple sclerosis: final analysis of the DAYBREAK open-label extension study. ACTRIMS Forum février/mars 2024, Florida; Poster P090.

Littérature sur demande.

Information professionnelle ZEPOSIA® (ozanimod) disponible sur le stand ou auprès des colaborateurs/trices.

Plus d'informations sur
www.zeposia.ch

CU: Colitis ulcerosa, **MS:** Multiple Sklerose, **S1P:** Sphingosin-1-Phosphat

* Bei Patient:innen mit leichter oder mässiger chronischer Leberfunktionseinschränkung (Child-Pugh-Klasse A oder B) wird empfohlen, 0.92 mg einmal jeden zweiten Tag einzunehmen.[1]

** Basierend auf der laufenden TRUE NORTH OLE, die in einer Interimsanalyse die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von Ozanimod bei CU-Patient:innen mit bis zu 4 Jahren kontinuierlicher Ozanimod-Behandlung untersucht.[2]

\# Gute Verträglichkeit von Ozanimod nach Langzeitexposition bei Patient:innen mit moderater bis schwerer CU (n = 131, Behandlungsdauer bis zu 194 Wochen bzw. ca. 4 Jahren)[3] und bei Patient:innen mit schubförmiger MS (DAYBREAK: n = 2494, durchschnittliche Behandlungsdauer 60.9 Monate; Phase 3 und DAYBREAK: N = 881, durchschnittliche Behandlungsdauer 74.8 Monate, maximale Behandlungsdauer 117.2 Monate).[4]

Referenzen: 1. Fachinformation ZEPOSIA® (Ozanimod), www.swissmedicinfo.ch. **2.** D'Haens G et al. Efficacy and safety of 4 years of continuous ozanimod treatment: an interim analysis of the True North open-label extension study. ECCO Februar 2024, Stockholm; Poster P1009. **3.** Schreiber SW et al. Efficacy of ozanimod by patient response trajectory subgroups identified using group-based trajectory modeling: a post hoc analysis of the phase 3 True North study. ECCO Februar 2024, Stockholm; Präsentation DOP78. **4.** Selmaj KW et al. Long-term safety and efficacy of ozanimod in relapsing multiple sclerosis: final analysis of the DAYBREAK open-label extension study. ACTRIMS Forum Februar/März 2024, Florida; Poster P090.

Literatur auf Anfrage.

Fachinformation ZEPOSIA® (Ozanimod) am Stand oder bei den Mitarbeiter:innen erhältlich.

Weitere Informationen unter
www.zeposia.ch

Bristol Myers Squibb™

Bristol Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, CH-6312 Steinhausen I immunology-ch@bms.com I Tel. +41 (0)41 767 72 00

2084-CH-250054_08/25

= 70 cm